

ANALISA PENGGUNAAN BAHAN PENGEMAS PADA MANISAN KERING TERONG HIJAU (SOLANUM MELONGENA I).

by No Name

Submission date: 16-Sep-2019 11:49AM (UTC+0700)

Submission ID: 1173482199

File name: Artikel 2 utk Bu Mitha.doc (105K)

Word count: 1921

Character count: 11637

ANALISA PENGGUNAAN BAHAN PENGEMAS PADA MANISAN KERING TERONG HIJAU (*SOLANUM MELONGENA* I).

ANALYSIS THE USE OF PACKAGING MATERIALS IN SWEET DRYING GREEN EGGPLANT (*SOLANUM MELONGENA* I).

ABSTRAK

Perkembangan produk olahan pangan bersifat dinamis, berbagai cara dilakukan untuk dapat memperpanjang umur simpan dan mengurangi kerusakan produk pangan, salah satu adalah dengan melakukan pengemasan. Produk manisan terong merupakan salah satu upaya olahan alternatif dari terong hijau, untuk meningkatkan jumlah konsumsi dan pemanfaatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahan pengemas plastik yang tepat untuk memperpanjang umur simpan dari manisan terong hijau. Hasil penelitian didapatkan setelah melakukan pembuatan manisan kering terong hijau yang diawali dengan tahap pencucian, penusukan, perendaman, pemasakan, pengeringan, pengemasan dan penyimpanan selama 7 hari. Kadar air manisan terong terbaik diketahui pada kemasan jenis plastik PE yaitu sebesar 33,8%. Sedangkan nilai ALT menunjukkan bahwa semakin rendah permeabilitas kadar air yang dimiliki oleh jenis bahan pengemas, maka semakin besar kemungkinan bagi mikroorganisme untuk tumbuh. Bahan pengemas jenis LDPE memiliki nilai ALT yang paling tinggi diantara PE, PET dan kombinasi LDPE. Hal ini diarekan permeabilitasnya terhadap udara cukup tinggi.

Kata Kunci: Pengemasan, Manisan Terong

ABSTRACT

The development of processed food products is dynamic, various methods are used to extend shelf life and reduce damage to food products, one of which is by packaging. Candied eggplant products are one of the alternative processed efforts of green eggplant, to increase the amount of consumption and utilization. This study aims to determine the right plastic packaging material to extend the shelflife of candied green eggplants. The result were obtained after making dried green eggplant candied which begins with the stage of washing, stabbing, soaing, cooking, drying, packaging and storage for 7 days. The best level of eggplants preserved water are known on the packaging type of plastic mika that is equal to 33,8%. While the ALT indicates that the lower the permeability of the water content held by the type of packaging material, the more likely it is for microorganisms to grow. LDPE material packaging have the highest ALT value among PE, PET dan LDPE combinations packaging. This is because the permeability to oxygen is quite high.

Keywords: Packaging, Sweet eggplant

PENDAHULUAN

Produk pangan merupakan jenis produk yang sangat mudah sekali mengalami kerusakan, karena itu diperlukan pengemas untuk dapat memperpanjang umur simpannya. Tujuan awal penggunaan pengemas adalah untuk mengurangi kerusakan pada bahan pangan, namun pada perkembangannya pengemasan juga memberikan nilai estetika dan nilai ekonomis yang lebih tinggi terhadap produk yang dikemasnya.

Produk manisan, merupakan salah satu produk pangan yang digemari mulai anak-anak hingga dewasa. Rasanya yang manis serta cara pembuatannya yang mudah membuat manisan kering terung hijau ini memiliki prospek yang bagus untuk dipasarkan. Standar manisan kering yang digunakan harus mengikuti standar mutu manisan pala yang sudah dikenal dan dikonsumsi masyarakat umum. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) manisan pala kering memiliki standar kadar air maksimal 40%, dan pada pemeriksaan biologi dinyatakan tidak ada bakteri golongan E.coli dll tidak ada, seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Standar Nasional Indonesia Manisan Buah Kering (SNI 01-4443-1998).

10	Parameter	Satuan
1	Keadaan (kenampakan, bau, rasa dan jamur)	Normal tidak berjamur
2	Kadar air	Maks 25% (b/b)
3	Jumlah gula (dihitung sebagai sukrosa)	Min 40%
4	Pemanis buatan	Tidak ada
5	Zat warna	Yang diizinkan untuk makanan
6	Benda asing (daun, tangkai, pasir dan lain-lain)	Tidak ada
7	Bahan pengawet (dihitung sebagai SO ₂)	Maks 50 mg/kg
8	Cemaran logam:	
	Tembaga (Cu)	Maks. 50 mg/kg
	Timbal (Pb)	Maks. 2,5 mg/kg
	Seng (Zn)	Maks. 40 mg/kg
	Timah (Sn)	Maks 150 mg/kg*
9	Arsen	Maks 1,0 mg/kg
10	Pemeriksaan mikrobiologi	
	Golongan bentuk E.coli	Tidak ada
	Bakteri Eschericchia coli	Tidak ada

Keterangan: (*) produk yang dikalengkan

Sumber : SNI (1998).

Produk manisan dapat dibagi menjadi 4 kelompok: (1) Manisan basah dengan larutan gula encer), (2) Manisan gula kental, (3) Manisan kering dengan yang sebagian gulanya tidak

larut dan menempel pada produk, (4) manisan kering asin, dengan unsur dominan adalah garam (Pratami, 2013).

Terung adalah salah satu jenis sayuran yang kurang dimanfaatkan secara luas, selama ini terung hanya digunakan sebagai sayur maupun lalapan. Untuk meningkatkan penggunaan dan daya tarik masyarakat terhadap terung hijau, perlu dilakukan berbagai alternatif bentuk olahan dari buah terung hijau, salah satunya adalah pembuatan produk manisan terung hijau.

Saat ini terdapat berbagai jenis bahan pengemas yang beredar dipasaran. Penggunaan bahan pengemas, harus disesuaikan dengan sifat bahan yang dikemas. Polietilen (PE) merupakan kemasan plastik yang fleksibel dan umum digunakan untuk mengemas produk ikan dan daging. Sifat dari polietilen antara lain: (1) mudah dibentuk dan lemas, (2) tahan terhadap asam basa, (3) kedap air dan uap, (4) daya rentang tinggi tanpa sobek, (5) mudah dikelim panas, (6) permeabilitas agak tinggi (Syarief et al, 1989).

Polyethylene terephthalate (PET) dibuat dari glikol dan terephthalate acid memiliki sifat jernih, kuat, liat, tahan nyala api, tidak beracun dan permeabilitas gas, aroma maupun air rendah (Mujiarto, 2005). Sedangkan untuk jenis plastik LDPE memiliki sifat yang hamper sama dengan plastik jenis PE yaitu memiliki permeabilitas agak tinggi (Wulandari et al, 2013).

BAHAN DAN METODE

Bahan

Terung hijau (*Solanum Melongena*), gula pasir, kayu manis, air kapur sirih, asam sitrat, plastik mika, plastik PET, *stand up pouch* (LDPE), plastik *stand up pouch* (aluminium + LDPE).

Alat

Loyang aluminium, *sealer manual*, kabinet *dryer*, dll

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan membuat manisan kering terung hijau (*Solanum melongena L*) pada konsentrasi yang tepat antara gula dan airnya, setelah itu dilakukan pengemasan dan penyimpanan terhadap manisan terung yang sudah jadi dengan menggunakan empat jenis bahan pengemas yang berbeda. Pengemas plastik digunakan untuk mengetahui perubahan fisik yang terjadi pada manisan terung hijau kering. Penyimpanan dilakukan selama 7 hari dan pengukuran diulang sebanyak 3 kali (Nofriati, 2013).

Kadar air

Analisa kadar air dilakukan dengan metode *thermogravimetri*, dengan prinsip dasar menghitung selisih dari berat sebelum dan sesudah sampel dipanaskan, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{kadar air (\%)} = \frac{\text{berat awal} - \text{berat akhir}}{\text{berat sampel}} \times 100\%$$

Penghitungan Angka Total Lempeng Mikroba

Dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 15 gram sampel, dimasukkan ke dalam botol pengencer yang telah berisi 125 ml larutan buffer pepton dan diaduk hingga homogen dan dilakukan pengenceran 10^{-5} (Atma Y, 2016). Setelah itu setiap seri pengenceran di inkubasi pada media agar selama 2 hari kemudian diamati jumlah koloni yang tumbuh pada setiap petridish.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengolahan terung hijau menjadi produk manisan kering terung, merupakan salah satu cara meningkatkan nilai jual dari terung. Tingginya kadar gula yang dimiliki oleh manisan terung membuat produk pangan jenis ini rentan mengalami kerusakan akibat kapang apabila disimpan terlalu lama pada suhu kamar. Pemilihan jenis kemasan yang tepat diharapkan dapat mengurangi kerusakan produk selama penyimpanan.

Analisa Kadar Air

Kandungan air pada bahan hasil pertanian memiliki pengaruh besar terhadap kerusakan bahan pangan, semakin tinggi kadar air pada bahan pangan, semakin pendek umur simpan dari produk pangan tersebut. Sebelum dilakukan pengemasan, manisan kering terung hijau memiliki kadar air sebesar 25,73. Setelah itu dilakukan penyimpanan selama 7 hari kemudian dilakukan kembali uji kadar air untuk mengetahui pengaruh setiap jenis kemasan. Untuk hasil uji kadar air manisan kering terung hijau (*Solanum Melongena L*) setelah melalui proses penyimpanan digambarkan dalam gambar dibawah ini.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengemasan selama 7 hari menyebabkan kadar air manisan terung kering meningkat. Rata-rata manisan terung kering setelah penyimpanan memiliki kadar air diatas 35%. Apabila dibandingkan dengan standar manisan kering pala, kadar air manisan terung hijau kering tidak sesuai dengan kadar air manisan kering (melebihi batas maksimal dari SNI).



Gambar 2. Kadar Air Manisan Kering Pada Berbagai Jenis Bahan Pengemas Plastik.

Manisan terung kering yang dikemas menggunakan mika yang terbuat dari plastik jenis PE menunjukkan kadar air paling rendah diantara jenis pengemas lainnya. Plastik jenis PE memiliki permeabilitas udara yang agak tinggi, namun permeabilitas uap air dan air rendah, sehingga meskipun tingginya gula yang memiliki sifat higroskopis dapat menyebabkan peningkatan kadar air selama penyimpanan, namun peningkatan kadar air tidak terjadi terlalu cepat.

Kemasan yang menggunakan jenis plastik PET memiliki permeabilitas udara yang rendah, dan permeabilitas uap air serta air cukup tinggi, hal ini menyebabkan kadar uap air yang berada dalam kemasan meningkat lebih cepat. Peningkatan kadar air pada kemasan dengan menggunakan plastik jenis ini semakin cepat akibat sifat gula yang higroskopis.

Berbeda dengan kadar air manisan terong yang tidak dikemas, pada sampel yang tidak dikemas kadar air cukup rendah, hal ini dikarenakan pada manisan terong yang dikemas tidak terjadi peningkatan kadar air selama masa penyimpanan. Hal ini menunjukkan bahwa jenis makanan yang memiliki kadar gula tinggi membutuhkan jenis pengemas yang memiliki permeabilitas udara tinggi namun kedap uap air.

Perhitungan Angka Lempeng Mikroba

Salah satu faktor penyebab kerusakan makanan adalah keberadaan mikroorganisme tertentu pada bahan pangan. Beberapa diantaranya yaitu bakteri, kapang dan khamir yang mampu tumbuh pada kondisi aerob maupun anaerob.

Analisa perhitungan angka lempeng total mikroba dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tipe masing-masing pengemas dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Tabel 2 menunjukkan bahwa total mikroba pada pengemas berbahan LDPE memiliki total mikroba paling tinggi diantara jenis pengemas lainnya. Sedangkan pada plastik pengemas lainnya,

nilai angka lempeng total mikroba diketahui cukup rendah. Kondisi ini disebabkan oleh adanya perbedaan permeabilitas udara yang cukup tinggi, Sifat inilah yang menyebabkan kadar air didalam kemasan LDPE meningkat.

Pengemas jenis LDPE memiliki permeabilitas udara tinggi dan tingginya kadar gula pada bahan pangan juga menyebabkan kandungan air didalam kemasan meningkat, hal ini dikarenakan sifat gula yang higroskopis atau mudah menyerap air sehingga peluang mikroorganisme untuk tumbuh semakin besar, terutama mikroorganisme jenis khamir.

Tabel 2. Perhitungan angka lempeng total mikroba manisan kering terong

Sampel	Pengenceran				
	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}
Tanpa Kemasan	3	2	2	2	3
Plastik mika (PP)	1	0	0	0	0
Plastik PET	3	1	0	0	1
Plastik LDPE	2	2	1	1	0
Plastik alu+LDPE	1	0	0	1	0

Pada penelitian Syarief (1991) dalam Renate (2009), diketahui bahwa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba antara lain adalah aktivitas air bahan pangan, semakin tinggi kadar air pada bahan pangan maka semakin tinggi pula aktivitas air yang dimiliki oleh bahan pangan. Aktivitas air menunjukkan jumlah air yang terdapat pada bahan pangan yang digunakan oleh mikroorganisme untuk berkembang biak, semakin tinggi aktivitas air yang dimiliki oleh bahan pangan, maka semakin besar kemungkinan bahan pangan

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya

1. Jenis pengemas terbaik yang dapat digunakan untuk mengemas makanan dengan kadar gula tinggi dan kadar air rendah adalah jenis plastik PE, dengan nilai kadar air paling rendah daripada semua pengemas yang digunakan yaitu sebesar 33,88%.

2. Hasil analisa Angka lempeng total mikroba (ALT) menunjukkan bahwa kemasan dengan jenis plastik LDPE memiliki jumlah mikroba lebih banyak dibandingkan kemasan yang lain.
3. Permeabilitas kemasan merupakan faktor utama dalam pemilihan kemasan, hal ini diperlukan untuk menjaga kadar air didalam kemasan untuk mempertahankan produk didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atma Y. 2016. Angka Lempeng Total (ALT), Angka Paling Mungkin (APM) dan Total Kapang Khamir Sebagai Metode Analisis Sederhana Untuk Menentukan Standar Mikrobiologi Pangan Olahan Posdaya. *Jurnal Teknologi* 8(2):77-82.
- Badan Standarisasi Nasional. (1998). Manisan Pala-SNI 01-4443-1998. Jakarta.
- Mujiarto I. 2005. Sifat dan Karakteristik Matertal Plastik dan Bahan Aditif. *Traksi* 3(2):65-73.
- Nofriati D. 2013. Kajian Pengawetan Manisan Kering Buah Nanas (*Ananas comosus L.Merr*) Selama Masa Penyimpanan. *Jurnal Agroindustri* 3(2): 77-82.
- Pratami N. 2012. Proses Produksi Manisan Basah Pare. *Tugas Akhir*. Program Studi Diploma III. Teknologi Hasil Pertanian. Fakultas Pertanian. Universitas Sebelah Maret. Surakarta.
- Renate D. 2009. Pengemasan Puree Cabe Merah. *Jurnal Teknologi Industri dan Hasil Pertanian* 14(1):80-89.
- Syarif R, Sassya S, Isyana BST. 1989. *Teknologi Pengemasan Pangan*. Laboratorium Rekayasa Proses Pangan PAU Pangan dan Gizi. IPB Bogor.
- Windyasari C, Wignyanto, Ikaputri W. 2012. Pengembangan Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi*) Sebagai Manisan Kering Dengan Kajian Konsentrasi Perendaman Air Kapur (Ca(OH)_2) dan Lama Waktu Pengeringan. *Jurnal Industri* 1(3):195-203.

Wulandari A, Waluyo S, Noviya D. 2013. Prediksi Umur Simpan Kerupuk Kemplang Dalam Kemasan Plastik Polipropilen Beberapa Ketebalan. *Jurnal Teknik Pertanian Lampung* 2(2):105-114.

ANALISA PENGGUNAAN BAHAN PENGEMAS PADA MANISAN KERING TERONG HIJAU (SOLANUM MELONGENA I).

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

id.123dok.com

Internet Source

6%

2

edoc.pub

Internet Source

3%

3

eprints.umm.ac.id

Internet Source

1%

4

media.neliti.com

Internet Source

1%

5

repository.unika.ac.id

Internet Source

1%

6

docobook.com

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches

< 20 words